


La técnica de Volumen Renderizado se utiliza para mostrar una proyección 2D en 3D.

Proporciona una representación más clara de la anatomía compleja con el fin de una mejor planificación quirúrgica.



De izquierda a derecha

1.Sin contraste.La imagen muestra una lesión lobulada parcialmente calcificada en región frontoparietal derecha

2.Reconstruido con alta resolución con ventana ósea muestra leve engrosamiento del [hueso parietal](#) derecho e hiperostosis

3.VRT axial y

4.MIP muestran el polígono de Willis y la proliferación de vasos en la lesión

5.VRT axial y

6.MIP muestran el tumor con su amplia base adherida al cráneo, y leve desplazamiento hacia la izquierda de la línea media

7 y 8.MIP lesión parcialmente calcificada,con vasos dilatados

9-12. En proyección sagital VRTS creada con diferentes ajustes presenta la masa y los vasos de drenaje. Todas las imágenes muestran buena opacificación y delimitación del seno sagital

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=3d_vrt

Last update: **2025/05/04 00:00**

