

Adenocarcinoma de etmoides

El [adenocarcinoma](#) de [etmoides](#) supone el 3% de las [neoplasias](#) de cabeza y cuello, representando entre el 10 y el 20% de los tumores del tracto nasosinusal con una [incidencia](#) de un caso por cada 100.000 habitantes al año.

Este tumor suele aparecer entre los 50 y 60 años de vida y es más frecuente en el sexo masculino, debido a su relación con la exposición ocupacional al polvo de madera y de cuero.

Varón de 72 años, que ingresa por [fístula de líquido cefalorraquídeo](#).

Intervenido de [adenocarcinoma](#) de [etmoides](#) realizándose [resección](#) craneofacial etmoides con exéresis tumoral , incluyendo [lámina cribosa](#) , [apófisis crista galli](#) y fragmento de [duramadre](#) limitrofe con la lesión tumoral. Reconstrucción con duramadre heteróloga + [fascia lata](#).



En [TAC](#) cerebral, se identifica extenso [neumoencéfalo](#) de predominio [frontal](#) izquierdo y algunas burbujas interhemisféricas así como una amplia solución de continuidad en el techo de la [fosa nasal](#) izquierda. Cambios postquirúrgicos, con resección de celdillas etmoidales, del [septo nasal](#) y cornetes superior y medio. Ocupación parcial de ambos senos maxilares y de seno esfenoidal.

Se realiza [punción lumbar](#), que resulta negativa para [infección](#) tanto a nivel bacteriológico como citobioquímico.

Consciente y orientada sin focalidad. No signos meníngeos. Afebril. Zona anterior del [colgajo](#) aparentemente despegada con área húmeda.

Buena evolución postqx. Se mantiene 7 días en reposo absoluto con taponamientos. Permanece afebril y sin focalidad neurológica. Cefalea mejorando progresivamente.

Se retiran taponamientos bajo visión fibroscópica con buen aspecto del cierre.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea** ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=adenocarcinoma_de_etmoides

Last update: **2025/05/04 00:03**

