

Astrocitoma pilocítico de cerebelo

Es un [tumor infratentorial](#), de crecimiento lento y con mayor frecuencia quístico, localizado en la [fosa posterior](#), y afecta a [hemisferio cerebeloso](#), el [vermis](#) o el piso del [cuarto ventrículo](#).

Epidemiología

Es el [tumor de cerebelo](#) más frecuente en niños.

Aunque puede ocurrir a cualquier edad, es mucho más frecuente entre los 5 y los 9 años.

Diagnóstico

En la resonancia magnética, es habitualmente un tumor sólido-quístico bien delimitado, iso-hipointensas en ponderación T1 e hiperintensas en ponderación T2.

Tienen realce intenso pero heterogéneo.

Tratamiento

La cirugía puede ser curativa si se consigue una resección completa del tumor.

La radioterapia adyuvante después de cirugía puede ser necesaria en los pacientes de más edad, con resecciones incompletas o con otros factores de riesgo.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=astrocitoma_pilocitico_de_cerebelo

Last update: 2025/05/04 00:01

