

# Braquicefalia

Cierre precoz de la [sutura coronal](#).



La cabeza es corta, ancha y aplanada a nivel occipital. Se produce por dormir siempre boca arriba. Afecta más a niños grandes y que duermen mucho.

Se considera que un bebé tiene Braquicefalia cuando el ancho (oreja a oreja) de su cráneo supera el 81% del largo (frente a nuca). Algunos bebés pueden llegar a tener una cabeza prácticamente cuadrada, es decir con un índice cefálico próximo al 100%.

## Diagnóstico diferencial

Una de sus variantes es la denominada braquiocefalia o braquicefalia posicional del lactante, deformación craneal no sinostósica que provoca un aplanamiento uniforme en la zona posterior del cráneo describiendo una cabeza ancha y lateralmente corta. Esta deformación suele ser producto de una postura prolongada en una sola posición.

Si el cierre prematuro se limita a una sutura coronal el resultado es la [plagiocefalia](#) aunque este tipo de deformidad craneal puede tener otras causas.

En el primer caso el cráneo es transversalmente ancho pero corto en sentido longitudinal.

Puede ocasionar [exoftalmos](#), [hipertelorismo](#), aplanamiento de la cara e incluso deficiencia mental.

En el segundo, la deformidad es asimétrica con aplanamiento del lado afectado y de la órbita ocular correspondiente, y prominencia del lado indemne.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**  
**ISSN 1988-2661**

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=braquicefalia>

Last update: **2025/05/04 00:01**

