

Cancer endometrial

El cancer endometrial indiferenciado es poco frecuente, presentándose sólo en el 9% de todos los carcinomas de endometrio

Estos tumores a menudo se clasifican de forma incorrecta como carcinoma endometriode de grado 3 según las directrices de la FIGO.

Se caracteriza microscópicamente por la presencia de zonas de alto grado que salen de los tumores de bajo grado.

Es un tumor agresivo incluso cuando el componente dediferenciado representa sólo el 20% de la totalidad de la neoplasia. En realidad, el sistema de FIGO se basa en características arquitectónicas, básicamente la cantidad de no-morular endometriode componente sólido en el cáncer a pesar de que no proporciona ningún detalle sobre las características histológicas de la componente de tumor sólido.

Un diagnóstico histológico adecuado es esencial para definir el enfoque terapéutico más apropiado para estos tumores, ya que se caracterizan por una tendencia especialmente agresiva y por un muy mal pronóstico.

Se ha descrito un caso único asociado a [metástasis cerebelosa](#) y adrenal, para el cual el paciente fue sometido a dos cirugías abdominales, pélvicas y de cerebelo ¹⁾

¹⁾

Berretta R, Patrelli TS, Faioli R, Mautone D, Gizzo S, Mezzogiorno A, Giordano G, Modena AB. Dedifferentiated endometrial cancer: an atypical case diagnosed from cerebellar and adrenal metastasis: case presentation and review of literature. Int J Clin Exp Pathol. 2013 Jul 15;6(8):1652-7. Print 2013. PubMed PMID: 23923084; PubMed Central PMCID: PMC3726982.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=cancer_endometrial

Last update: **2025/05/03 23:57**

