

Ciclofosfamida, también conocida por sus nombres comerciales Citoxan, Neosar, Genuxal, Citofosfana o Endoxan nitrógeno es un agente del grupo de oxazoforinas.

El principal uso de la ciclofosfamida junto a otros agentes de quimioterapia es en el tratamiento de linfomas, algunos tipos de leucemia, tumores, como también para tratar enfermedades auto-inmunes como el Lupus eritematoso sistémico, Granulomatosis de Wegener, Esclerosis múltiple.

Los efectos secundarios más importantes son los siguientes:

Aumento de la posibilidad de generar cáncer de próstata y en las vías renales.

Hemorragia en la vejiga.

Dolor al orinar, producido por la irritación del fármaco.

Probabilidad de esterilidad en hombres y mujeres.

Nauseas.

Neutropenia.

Amenorrea.

Al tomar este medicamento se recomienda tomar grandes cantidades de líquido para así mejorar la función renal y evitar problemas con la toxicidad del mismo.

En los tumores germinales del sistema nervioso central infantil, indica que la mayoría de estos tumores responden a la ciclofosfamida y otros medicamentos que contienen platino, aún no se ha determinado la función definitiva de la quimioterapia.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=ciclofosfamida>

Last update: **2025/05/04 00:01**

