

Entre 1870 y 1880, la cirugía cerebral se limitó esencialmente al tratamiento del trauma. Estas cirugías eran realizadas por el cirujano que estaba disponible, con frecuencia instigado por un neurólogo.

En 1889, Henry H.A Beach realizó la primera craneotomía en el Hospital General de Massachusetts, basada únicamente en localización cerebral. El paciente fue diagnosticado por Putnam con un tumor cerebral. Sin embargo, durante la cirugía no se pudo localizar el tumor. Finalmente el tumor se identificó durante la autopsia del paciente. Tres meses antes el Dr. E. H. Bradford en el Hospital de la Ciudad de Boston había realizado la primera craneotomía para el tratamiento de un tumor cerebral.

Los resultados de las primeras craneotomías electivas en el Hospital General de Massachusetts, fueron desalentadores. Un reporte en 1905, de 36 trepanaciones para el tratamiento de un tumor cerebral no habían logrado curar a un solo paciente.

A diferencia de la cirugía abdominal, la cirugía cerebral se considera “limpia”, sin exposición a patógenos enterales (Wittmann y Condon, 1991).

## Bibliografía

Wittmann, D H, and R E Condon. 1991. “Prophylaxis of Postoperative Infections.” Infection 19 Suppl 6: S337–344.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**  
**ISSN 1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=cirugia\\_cerebral](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=cirugia_cerebral)

Last update: **2025/05/04 00:01**

