

Las Cisternas Subaracnoideas son compartimentos de líquido cefalorraquídeo que se encuentra intercomunicados y que contienen vasos sanguíneos y nervios. Magendie (1822) dio la primera descripción moderna del espacio subaracnoideo y las cisternas.

Pueden ser clasificadas:

I.- Cisternas Supratentoriales:

A) Anterior (paraselares)

[Cisterna Carotídea](#)

[Cisterna quiasmática](#)

[Cisterna de la lamina terminalis](#)

[Cisterna olfatoria](#)

[Cisterna Silviana](#)

B) Lateral (parapeduncular)

[Cisterna crural](#)

[Cisterna ambiens](#)

C) Posterior

[Cisterna cuadrigeminal](#)

[Cisterna del velum interpositum](#)

D) Superior

[Cisterna del cuerpo calloso](#)

[Cisterna Hemisférica](#)

II.- Cisternas infratentoriales

A) Anterior

[Cisterna interpeduncular](#)

[Cisterna prepontina\]\]](#)

[Cisterna premedular\]\]](#)

B) Lateral

[Cisterna Ambiens \(parte posterior\)](#)

[Cisterna cerebelo-pontina superior](#)

[Cisterna cerebelomedular o cerebelo-pontina inferior](#)

C) Posterior

[Cisterna Magna](#)

Cisterna cerebelosa superior

D) Superior

[Cisterna Vermiana](#)

Cisterna Hemisférica

From:

<http://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN
1988-2661**

Permanent link:

http://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=cisternas_subaracnoideas

Last update: **2025/05/04 00:00**

