

Clasificación clínica del traumatismo craneoencefálico

De acuerdo a la severidad:

[Traumatismo craneoencefálico leve](#)

[Traumatismo craneoencefálico moderado](#)

[Traumatismo craneoencefálico grave](#), según la [escala de Glasgow \(GCS\)](#).

También puede clasificarse en

[Traumatismo craneoencefálico abierto](#)

[Traumatismo craneoencefálico cerrado](#)

Abierto o Cerrado según haya o no comunicación de la cavidad craneana con el exterior por solución de continuidad en el cuero cabelludo.

Según la edad se pueden subdividir en [traumatismos craneoencefálicos en edad pediátrica](#).

TCE abierto o penetrante

Las lesiones cerebrales “penetrantes” se producen cuando perfora el cráneo un objeto que se mueve a alta velocidad, como una bala.

Tanto las lesiones cerebrales cerradas como las penetrantes pueden provocar daños localizados o difusos en el cerebro.

Tipos especiales

[Traumatismo craneoencefálico por maltrato](#).

Paciente de 56 años, que ingresa por [traumatismo craneoencefálico moderado](#)

Antecedentes

Mecanismo del TCE

Exploración del TCE

From:
<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=clasificacion_clinica_del_traumatismo_craneoencefalico

Last update: **2025/05/03 23:59**

