

Clasificación de Koos

Sistema de clasificación del [schwannoma del nervio vestibular](#)

Estadío o grado 1- Intracanalicular

Estadío 2- En ángulo pontocerebeloso sin contacto pontino

Estadío 3- Contacto pontino pero sin desplazamiento

[Clasificación de Koos estadío 4](#)

Stage I	Intracanalicular tumor
Stage II	Tumor spreading in the cerebellopontine angle but not reaching the pons
Stage III	Tumor reaching the pons, perhaps deforming it but not shifting it
Stage IV	Tumor deforming the pons and shifting the fourth ventricle

(Koos, 1988).

Mindermann y Schlegel sugieren limitar el grado 4 de Koos a volúmenes tumorales de <6 cc que pueden ser tratados mediante radiocirugía, e introducir un grado V adicional para volúmenes tumorales de > 6 cc que pueden no ser candidatos para radiocirugía (Mindermann y Schlegel, 2013).

Véase [clasificación de Samii](#)

Bibliografía

Koos, W T. 1988. "Criteria for Preservation of Vestibulocochlear Nerve Function During Microsurgical Removal of Acoustic Neurinomas." Acta Neurochirurgica 92 (1-4): 55-66.

Mindermann, T., and I. Schlegel. 2013. "Grading of Vestibular Schwannomas and Corresponding Tumor Volumes: Ramifications for Radiosurgery." Acta Neurochirurgica 155 (1) (January 1): 71-74. doi:10.1007/s00701-012-1553-4.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=clasificacion_de_koos

Last update: 2025/05/04 00:04

