

Clasificación de Meyerding

Sistema de clasificación de la [espondilolistesis](#).

Se divide la superficie superior de S1 en cuatro partes iguales, a las que se les da la valoración de Grado 1, 2, 3 y 4 de dorsal hacia ventral. La ptosis del cuerpo de L5 se le llama también grado 5.

Para determinar el grado de listesis, se baja una línea siguiendo el borde posterior del cuerpo de L5, dependiendo en qué cuarto de espacio de la superficie superior del sacro cae esta línea, se habla de espondilolistesis de grado 1, 2, 3, ó 4.

El método de Meyerding no discrimina sino de a cuartos, por lo que actualmente se usa más el método de Marique-Taillard y Bradford, que mide en porcentaje el grado de desplazamiento, así:

el grado I presenta una traslación de hasta 25%,

el grado II entre 25% y 50%,

el grado III entre 50% y 75%,

el grado IV entre 75% y 100%

el grado V mayor del 100% (también llamada espondiloptosis).

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN
1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=clasificacion_de_meyerding

Last update: **2025/05/03 23:59**

