

Clínica de la hemorragia cerebral

La **clínica** va a depender de la **localización**, del **tamaño**, del **edema** acompañante y la presencia de **hidrocefalia** entre otros.

Característicamente se produce una **cefalea**, **vómito** y alteración en el **nivel de conciencia**.

Puede presentarse como **hemiparesia**, disminución de la apertura y desviación de los ojos hacia el lado del cerebro donde se produjo la hemorragia y dificultad para hablar. También puede manifestarse con una alteración para mover los ojos y disminución en la sensibilidad.

Uno de cada 4 pacientes va a presentar un deterioro clínico en las próximas 24 horas sobre todo en alcoholismo, hematoma irregular, nivel de conciencia bajo y niveles bajos de fibrinógeno. Antecedentes de isquemia cerebral, enfermedad hepática, niveles altos de glucosa, y tensión arterial por encima de 200 mm Hg.

Déficit neurológico focal de inicio rápido,

cefalea

náuseas,

vómitos(49%),

disminución precoz del nivel de conciencia (50%)

aumento de la presión arterial (90%)

Comienza habitualmente en vigilia.

Localización	Síntomas Motores	Síntomas sensitivos	Movimientos oculares	Pupilas	Otros
PUTAMEN	Hemiparesia / Hemiplejía contralateral	Pérdida de sensibilidad contralateral	Paresia de la mirada conjugada contralateral raramente ipsilateral	Normales	Hemianopsia homónima, afasia (izquierda). Negligencia o apraxia (derecha)
TÁLAMO	Hemiparesia contralateral	Pérdida de sensibilidad contralateral	Paresia de la mirada conjugada contralateral o ipsilateral, desviación hacia abajo de la mirada, alteración de la mirada hacia arriba, desviación oblicua, nistagmo de convergencia o retracción uni o bilateral, pseudoparálisis VI par	Pequeñas, débilmente reactivas	Afasia (izquierda)
PUENTE	Cuadriparesia, cuadriplejía, debilidad facial bilateral, síndrome de endaustramiento (locked in)		Paresia de la mirada horizontal bilateral, movimientos verticales preservados, bobbing ocular	Puntiformes reactivas	Coma, hipertermia, hiperventilación
CEREBELO	Ataxia troncal de la marcha o de miembros. Debilidad facial ipsilateral	Pérdida de sensibilidad facial ipsilateral. Alteración del reflejo corneal.	Parálisis de la mirada conjugada ipsilateral, parálisis del abductor, desviación oblicua, nistagmo parético	Pequeñas, reactivas	Progresiva, signos sensitivos y motores bilaterales, coma.
FRONTAL	Hemiparesia contralateral		Paresia de la mirada conjugada contralateral	Normales	Afasia (izquierda), abulia
PARIETAL	Hemiparesia contralateral		Pérdida de sensibilidad contralateral	Normales	Hemianopsia homónima contralateral. Afasia (izquierda), apraxia, negligencia (derecha)
TEMPORAL	-			Normales	Hemianopsia homónima contralateral

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=clinica_de_la_hemorragia_cerebral

Last update: **2025/05/03 23:57**

