

Crisis insular

Crisis que tiene su origen en la [ínsula](#).

Penfield los describió como síntomas del tracto gastrointestinal, a juzgar por el hecho de que la estimulación aquí produce varios tipos de sensación abdominal, tales como [náusea](#), sensación umbilical, [borborismo](#), eructos, y el deseo de defecación ¹⁾

Tratamiento

La [insulectomía](#) se asocia con baja morbilidad permanente y una alta tasa de control de las crisis ²⁾.

La [gammaknife](#) es una técnica prometedora para los pacientes con [epilepsia farmacorresistente](#)³⁾.

Bibliografía

¹⁾

Penfield W, Jasper H. Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain. Boston: Little Brown; 1954.

²⁾

Malak R, Bouthillier A, Carmant L, Cossette P, Giard N, Saint-Hilaire JM, Nguyen DB, Nguyen DK. Microsurgery of epileptic foci in the insular region. J Neurosurg. 2009 Jun;110(6):1153-63. doi: 10.3171/2009.1.JNS08807. PubMed PMID: 19249926.

³⁾

Irislimane M, Mathieu D, Bouthillier A, Deacon C, Nguyen DK. Gamma knife surgery for refractory insular cortex epilepsy. Stereotact Funct Neurosurg. 2013;91(3):170-6. doi: 10.1159/000343205. Epub 2013 Feb 27. PubMed PMID:23446057

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**

ISSN 1988-2661



Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=crisis_insular

Last update: **2025/05/04 00:00**