

Se usa como screening y herramienta de diagnóstico para los trastornos de salud mental en la depresión, ansiedad.....

La angustia psicológica es frecuente en pacientes con tumores cerebrales y puede ser identificado con éxito utilizando el PHQ-2.

El PHQ-2 tiene una consistencia interna moderada y debe ser considerado para su uso rutinario en pacientes con tumores cerebrales para la detección de angustia psicológica.

## The Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2)

Patient Name \_\_\_\_\_ Date of Visit \_\_\_\_\_

| Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by any of the following problems? | Not At all | Several Days | More Than Half the Days | Nearly Every Day |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------|
| 1. Little interest or pleasure in doing things                                            | 0          | 1            | 2                       | 3                |
| 2. Feeling down, depressed or hopeless                                                    | 0          | 1            | 2                       | 3                |

Bunevicius, Adomas, Vytenis Deltuva, Sarunas Tamasauskas, Arimantas Tamasauskas, and Robertas Bunevicius. 2012. "Screening for Psychological Distress in Neurosurgical Brain Tumor Patients Using the Patient Health Questionnaire-2." Psycho-oncology (December 12). doi:10.1002/pon.3237.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=cuestionario\\_de\\_salud\\_phq](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=cuestionario_de_salud_phq)

Last update: 2025/05/03 23:58

