

Derivación de líquido cefalorraquídeo

Las derivaciones de [líquido cefalorraquídeo](#) (LCR) se usan para tratar la [hidrocefalia](#).

Estos dispositivos permiten que el exceso de LCR se drene a otra área del cuerpo.

Normalmente está formada por dos [catéteres](#) y una [válvula](#) unidireccional.

A medida que aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, la [válvula](#) unidireccional se abre y el exceso de líquido se drena a otra parte del cuerpo.

Tipos

Normalmente, el líquido se “desvía” (drena) usando los siguientes tipos de derivación:

[Drenaje ventricular externo](#)

[Derivación ventriculoperitoneal](#)

[Derivación ventrículoatrial](#)

[Derivación lumboperitoneal](#)

Aunque existen otras posibilidades las anteriormente mencionadas son las más habituales.

[Derivacion de Torkildsen](#)

[Derivacion ventriculopleural](#)

Complicaciones

[Infección del líquido cefalorraquídeo](#)

[Obstrucción del catéter](#)

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=derivacion_de_liquido_cefalorraquideo

Last update: 2025/05/03 23:57

