

Edema cerebral maligno

Se trata del [edema cerebral](#) refractario a tratamiento médico.

Tipos

Puede ser posttraumático o por un ictus isquémico.

Ictus isquémico

La [craniectomía](#) se realiza cada vez más tras la isquemia cerebral de un territorio grande.

El aumento de la incidencia podría estar directamente relacionada con la creciente evidencia en ensayos aleatorios de que la operación es eficaz cuando se realiza en la población de pacientes correcta, aunque la mortalidad hospitalaria es alta para todos los pacientes tratados con este procedimiento (Walcott y col., 2011).

Bibliografía

Walcott, Brian P, Elena V Kuklina, Brian V Nahed, Mary G George, Kristopher T Kahle, J Marc Simard, Wael F Asaad, and Jean-Valery C E Coumans. 2011. "Craniectomy for Malignant Cerebral Infarction: Prevalence and Outcomes in US Hospitals." PloS One 6 (12): e29193.
doi:10.1371/journal.pone.0029193.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=edema_cerebral_maligno

Last update: **2025/05/03 23:59**

