

Encefalocele transetmoidal

En el tipo transetmoidal o nasoetmoidal el [encefalocele basal](#), protruye hacia la cavidad nasal a través de un defecto óseo de la [lámina cribiforme del etmoides](#).

Por lo general se diagnostica durante el primer decenio de la vida.

No hay una predominio de presentación según el sexo.

Clinica

Se manifiesta principalmente con obstrucción nasal y [rinorrea](#) y menos frecuentemente con epistaxis, rinoliquorrhea y meningitis recurrente.

Se ha descrito que puede ocasionar epilepsia.

Se conoce un caso de meningocele transetmoidal secundario a una neoplasia intracraneal en un hombre de 42 años de edad, que se presentó con la aparición repentina de sensorio alterado. El meningocele transetmoidal fué secundario a un quiste epidermoide intraventricular (Singh y col., 2013).

Bibliografía

Singh, Deepak Kumar, Neha Singh, and Ragini Singh. 2013. "Transethmoidal Meningocele: An Unusual Complication of Intracranial Neoplasm." BMJ Case Reports 2013. doi:10.1136/bcr-2013-009200.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**



Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=encefalocele_transetmoidal

Last update: **2025/05/03 23:58**