

Epidermoide intramedular

El epidermoide intramedular es poco común, con menos de 60 casos reportados en la literatura desde la primera presentación de la entidad por Chiari en 1833.

Es más común en la región dorsal y lumbosacra, con dos localizaciones frecuentes en T4-T6 y T11-T12, y sólo tres casos publicados a nivel cervical (Agarwal et al. 2011).

Diagnóstico

En RM presentan intensidad de señal típica, ausencia de edema peritumoral, límites nítidos y mínimo realce periférico con gadolinio.

Tratamiento

El vaciamiento del quiste y la resección de la cápsula es el tratamiento de elección.

Bibliografía Agarwal A, Bhake A, Kakani A. Cervical intramedullary epidermoid cyst with liquid contents. Asian Spine J. 2011 Mar;5(1):59-63.

Kumar A, Singh P, Jain P, Badole CM. Intramedullary spinal epidermoid cyst of the cervicodorsal region: A rare entity. J Pediatr Neurosci. 2010 Jan;5(1):49-51.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=epidermoide_intramedular

Last update: 2025/05/04 00:01

