

Los **quistes epidermoides intradiploicos** de la órbita ósea son extremadamente raros.

El primer caso descrito es el de Wakai en 1983 (Wakai, 1983).

## Clínica

La proptosis causada por la extensión de la masa intraorbitaria es el signo de presentación más frecuente.

## Diagnóstico

Los hallazgos en TAC de alta resolución parecen ser específica con un margen esclerótico típico (Eijpe y col., 1991).

Blanco y col., describen un caso de la pared orbitaria lateral que provocó proptosis del ojo izquierdo. La tomografía computarizada y la resonancia magnética mostraban una masa ósea con destrucción de los huesos frontal, esfenoides y cigomático que se extendían hacia la órbita, temporal, y fosa craneal anterior. La extirpación quirúrgica completa se llevó a cabo a través de un orbitotomía lateral. La pared lateral se reconstruyó con una hoja de polietileno poroso. El quiste no volvió a aparecer tras 18 meses de seguimiento (Blanco y col., 2001).

Akkaba y col., describen uno que a nivel orbitario provocó fistulización cutánea en la cara lateral del párpado superior izquierdo (Akbaba y col., 2012).

Los pocos casos que han sido publicados corresponden a pacientes en las primeras cuatro décadas de la vida. Ormond y col., presentan un caso en persona de edad avanzada.

Se trataba de un hombre de 67 años de edad que presentaba cefalea izquierda y dolor ocular.

Se apreció una lesión hemorrágica con erosión ósea en alas mayores y menores del esfenoides que comprimían y desplazan los lóbulos frontal y temporal con edema.

Se realizó una extirpación quirúrgica agresiva con craneoplastia y reconstrucción orbitaria, con resolución de la proptosis y dolor ocular (Ormond y col., 2011).

## Bibliografía

Akbaba M, Karsloğlu S, Damlack A, Karcoğlu ZA. Intradiploic epidermoid cyst of frontal bone with spontaneous fistulization to eyelid. *Ophthal Plast Reconstr Surg*. 2012 Jan;28(1):e15-7. PubMed PMID: 21464786.

Blanco G, Esteban R, Galarreta D, Saornil MA. Orbital intradiploic giant epidermoid cyst. *Arch Ophthalmol*. 2001 May;119(5):771-3. PubMed PMID: 11346410.

Eijpe AA, Koornneef L, Verbeeten B Jr, Peeters FL, Zonneveld FW, Bras J. Intradiploic epidermoid cysts of the bony orbit. *Ophthalmology*. 1991 Nov;98(11):1737-43. PubMed PMID: 1800936.

Ormond DR, Omeis I, Abrahams J. Uncommon presentation of an intradiploic orbital epidermoid tumor: case report. *Oral Maxillofac Surg*. 2011 Sep;15(3):165-7. Epub 2010 Jun 5. PubMed PMID: 20526639.

Last  
update: 2025/05/03 23:59 epidermoide\_orbitario\_intradiploico [https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=epidermoide\\_orbitario\\_intradiploico](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=epidermoide_orbitario_intradiploico)

---

Wakai S. Intradiploic epidermoid tumor of the lateral orbital wall-case report. Neurol Med Chir (Tokyo). 1983 Jul;23(7):577-9. PubMed PMID: 6196662.

From:  
<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea** ISSN 1988-2661

Permanent link:  
[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=epidermoide\\_orbitario\\_intradiploico](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=epidermoide_orbitario_intradiploico)

Last update: **2025/05/03 23:59**

