

Espondilodiscitis

La discitis o espondilodiscitis es un proceso inflamatorio que afecta al [disco intervertebral](#) y a la superficie del [cuerpo vertebral](#).

Epidemiología

Como complicación postoperatoria se presenta en el 0,2- 4% y comienza más frecuentemente entre la 1-4 semana tras la intervención.

Concretamente y tras la [microdiscectomía lumbar](#) se puede presentar entre el 0.2- 15%.

Aunque la columna lumbar o torácica baja es la zona que se afecta de forma más frecuente, existen casos descritos de discitis cervical.

ver [Espondilodiscitis lumbar](#)

Los pacientes en hemodiálisis tienen mayores índices de ED infecciosa debido al desarrollo de bacteriemias asociadas al uso de DIV (1,5-5,5 episodios por 1000 días-catéter), de los cuales un 1,3 % desarrollarán en algún momento esta infección, siendo tres veces más frecuente con el uso de un catéter central que con una fístula arteriovenosa ¹⁾.

¹⁾
Garcia-Garcia P, Rivero A, del Castillo N, Jarque A, Getino MA, García-Pérez J, et al. Infectious spondylodiscitis in hemodialysis. Seminars in Dialysis 2010;6:619-26.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=espondilodiscitis>

Last update: **2025/05/04 00:01**

