


Espondilolistesis



Es el deslizamiento de una vértebra sobre la que le sigue.

El deslizamiento puede ser sólo del cuerpo o de toda la vértebra. En el primer caso, debe haber una lisis a nivel de la “pars articularis” que permite que el cuerpo se vaya deslizando lentamente y el arco posterior se queda atrás. Frecuentemente, se localiza a nivel de la columna lumbosacra.

Tipos

Espondilolistesis cervical

Espondilolistesis dorsal

[Espondilolistesis lumbar](#)

Frecuentemente, se localiza a nivel de la columna lumbosacra.

Existen múltiples clasificaciones de espondilolistesis que la diferencian según su origen, su grado de desplazamiento y su posibilidad de progresión.

La clasificación de Wiltse las diferencia según la causa que las origina en

Displásica

[Espondilolistesis ístmica](#)

Traumática

Degenerativa

Patológica.

La [clasificación de Meyerding](#) las divide según su porcentaje de desplazamiento en relación con la vértebra caudal en cinco grados.

La [espondilolistesis de alto grado](#) son mayor o igual a un grado III de esta clasificación.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=espondilolistesis>

Last update: **2025/05/04 00:01**

