

Es un **tumor óseo** benigno que se produce normalmente en la metáfisis de huesos largos. La localización en **columna vertebral** es poco frecuente, siendo más frecuente en los segmentos **cervical** y **torácico**.

La localización lumbar es extremadamente rara.

Se ha de considerar la posibilidad de recidiva, incluso en el caso de una extirpación quirúrgica completa.

La administración de **radioterapia** es controvertido debido a la sospecha de transformación maligna del tumor (Gutiérrez-González y col., 2011).

Bibliografía

Gutiérrez-González, Raquel, Laura De Reina, Anwar Saab, José Jiménez-Heffernan, and José García-Uriá. 2011. "Chondromyxoid fibroma of the lumbar spine: case report and literature review." European Spine Journal: Official Publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society (November 18). doi:10.1007/s00586-011-2078-x. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22094389>.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=fibroma_condromixoide

Last update: **2025/05/04 00:04**

