

Son raras.

Tiene mayor incidencia de recurrencia y necesidad de tratamiento posterior.

En una serie de 51 casos. Cuatro pacientes (7,8%) tuvieron la fistula en la región sacra. En todos los casos, irrigados por la arteria sacra lateral. Múltiples en 3 (75%) de 4 pacientes y 2 pacientes (50%) tenían fístulas múltiples.

Se realizaron en todos los pacientes embolizaciones endovasculares.

Los síntomas neurológicos mejoraron en dos pacientes (50%) y los otros dos estabilizados (50%).

No hubo ninguna recurrencia durante un período de seguimiento de 3 meses a 8 años (Sasamori et al. 2011).

Bibliografía

Sasamori, Toru, Kazutoshi Hida, Takeshi Asano, Takeshi Aoyama, Tomohiro Yamauchi, Motoyuki Iwasaki, Shunsuke Yano, Yoshinobu Iwasaki, y Kiyohiro Houkin. 2011. «[Sacral Dural Arteriovenous Fistula: Report of 4 Cases.]». No Shinkei Geka. Neurological Surgery 39 (5) (Mayo): 505-511.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=fistula_arteriovenosa_dural_sacra

Last update: 2025/05/03 23:57

