

La furosemida es un diurético fuerte ('píldora de agua') y puede ocasionar deshidratación y desequilibrio electrolítico. Es importante que la tome exactamente como le indicó el médico. Si experimenta alguno de los síntomas siguientes, llame a su médico de inmediato: pérdida de peso excesiva, rápida; micción menos frecuente; boca seca; sed; náuseas; vómitos; debilidad; somnolencia; confusión; dolor muscular o espasmos; o latidos cardíacos rápidos o fuertes. ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La furosemida se utiliza sola y en combinación con otros medicamentos para tratar la hipertensión arterial. La furosemida se utiliza para tratar el edema (la retención de líquidos; exceso de líquido retenido en los tejidos corporales) causado por varios problemas médicos, incluyendo el corazón, el riñón y enfermedades del hígado. La furosemida pertenece a una clase de medicamentos que se llaman diuréticos ('píldoras de agua'). Funciona provocando la eliminación por el riñón, a través de la orina, del agua y de sal innecesarias en el cuerpo.

La hipertensión arterial es una condición común y cuando no se trata, puede causar daños en el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y otras partes del cuerpo. El daño a estos órganos puede causar enfermedades del corazón, un infarto, insuficiencia cardíaca, apoplejía, insuficiencia renal, pérdida de la visión y otros problemas. Además de tomar medicamentos, hacer cambios de estilo de vida también le ayudará a controlar su presión arterial. Estos cambios incluyen comer una dieta que sea baja en grasa y sal, mantener un peso saludable, hacer ejercicio al menos 30 minutos casi todos los días, no fumar y consumir alcohol con moderación. ¿Cómo se debe usar este medicamento?

La furosemida se presenta en tabletas y en solución (líquido) para administración oral. Usualmente se toma una o dos veces al día. Cuando se usa para tratar el edema, la furosemida puede tomarse a diario o solo determinados días de la semana. Cuando se utiliza para tratar la hipertensión, tome furosemida aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome la furosemida exactamente como se le indique. No tome más ni menos cantidad del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico.

La furosemida controla la hipertensión arterial y el edema, pero no cura estas afecciones. Continúe tomando la furosemida incluso si se siente bien. No deje de tomar la furosemida sin hablar con su médico. ¿Qué otro uso se le da a este medicamento?

Algunas veces este medicamento se puede recetar para otros usos; pida más información a su médico o farmacéutico. ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? Antes de tomar la furosemida,

informe a su médico o farmacéutico si es alérgico a la furosemida, medicamentos con sulfonamida, cualquier otro medicamento, a alguno de los ingredientes que contienen las tabletas o la solución de furosemida. Consulte con su farmacéutico o revise la información para el paciente para obtener una lista de los ingredientes.

Informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos de hierbas está tomando o tiene planificado tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: antibióticos aminoglucósidos como amikacina, gentamicina (Garamycin), o tobramicina (Bethkis, Tobi); inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) como benazepril (Lotensin en Lotrel), captopril (Capoten), fosinopril, lisinopril (en Prinzide, en Zestoretic),

moexipril (Univasc en Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, en Accuretic), ramipril (Altace) y trandolapril (Mavik en Tarka); angiotensin II antagonistas de los receptores (ARB) como azilsartan (Edarbi, Edarbyclor), candesartan (Atacand, en Atacand HCT), eprosartan (Teveten, en Teveten HCT), irbesartan (Avapro, en Avalide), losartan (Cozaar, en Hyzaar), olmesartan (Benicar, en Azor, Benicar HCT), telmisartan (Micardis, en Micardis HCT) y valsartan (Diovan, en Diovan HCT, Exforge); aspirina y otros silicilatos; barbitúricos como el fenobarbital y secobarbital (Seconal); corticosteroides como betametasona (Celestone), budesonida (Entocort), cortisona (Cortone), dexametasona (Decadron, Dexpak, Dexasone, otros), fludrocortisona (Floriner), hidrocortisona (Cortef, Hydrocortone), metilprednisolona (Medrol, Meprolone, otros), prednisolona (Prelone, otros), prednisona (Deltasone, Meticorten, Sterapred, otros) y triamcinolona (Aristocort, Azmacort); cisplatino (Platinol); ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoxina (Lanoxin), ácido etacrínico (Edecrin); indometacina (Indocin); laxantes; litio (Lithobid); medicamentos para la diabetes, hipertensión arterial y dolor; metotrexato (Trexall); probenecid (Probalan, Probenemid); y fenitoína (Dilantin, Fhenytek). Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o supervisarle atentamente para saber si sufre efectos secundarios.

Si está tomando sucralfato (Carafate), tómelo 2 horas antes o después de tomar la furosemida.

Informe a su médico si padece de enfermedad renal. Su médico podría indicarle que no tome furosemida.

Informe a su médico si padece o ha padecido de cualquier afección que haga que su vejiga no se vacíe por completo, diabetes, gota, lupus eritematoso sistémico (LES, una condición inflamatoria crónica) o enfermedad hepática.

Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. No amamante mientras esté tomando este medicamento. Si queda embarazada mientras toma la furosemida, llame a su médico.

Planifique para evitar la exposición innecesaria o prolongada a la luz solar y use ropa protectora, gafas de sol y protector solar. La furosemida podría hacer que su piel sea sensible a la luz solar.

Debe saber que la furosemida puede ocasionar mareo, aturdimiento y desmayo cuando se levanta muy rápido cuando está acostado. Esto es más común al empezar a tomar furosemida por primera vez. Para evitar este problema, levántese de la cama despacio, apoyando sus pies en el suelo por unos minutos antes de levantarse. El alcohol puede aumentar estos efectos secundarios.

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?

Si su médico le receta una dieta baja en sal o baja en sodio, o que coma o beba una mayor cantidad de alimentos ricos en potasio (por ejemplo, plátanos, ciruelas, pasas y jugo de naranja) en su dieta, siga estas instrucciones atentamente. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que le faltó y continúe con su programa regular de dosificación. No duplique la dosis para compensar la dosis omitida. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece:

micción frecuente
visión borrosa
dolor de cabeza
estreñimiento
diarrea

Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si presenta algunos de estos síntomas o los que se enumeran en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico inmediatamente o busque tratamiento médico de emergencia:

fiebre
zumbido en los oídos
pérdida auditiva
sarpullido
urticaria
ampollas o descamación de la piel
picazón
dificultad para respirar o tragar
ictericia en piel u ojos

Si desarrolla un efecto secundario grave, usted o su doctor puede enviar un informe al programa de divulgación de efectos adversos 'MedWatch' de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en la página de Internet (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>) o por teléfono al 1-800-332-1088. ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño). Deseche la solución de furosemida que no utilizó después de 90 días.

Es importante que mantenga todos los medicamentos fuera de la vista y el alcance de los niños, debido a que muchos envases (tales como los pastilleros de uso semanal, y aquellos que contienen gotas oftálmicas, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños pequeños, quienes pueden abrirlos fácilmente. Con el fin de protegerlos de una intoxicación, siempre use tapaderas de seguridad e inmediatamente coloque los medicamentos en un lugar seguro, uno que se encuentre arriba y lejos de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org/es/>

Los medicamentos que ya no son necesarios se deben desechar de una manera apropiada para asegurarse de que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe desechar estos medicamentos por el inodoro. En su lugar, la mejor manera de deshacerse de sus medicamentos es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o póngase en contacto con su departamento de basura/reciclaje local para conocer acerca de los programas de devolución de medicamentos de su comunidad. Consulte el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), (<https://goo.gl/xRXbPn>) para obtener más información de cómo desechar de forma segura los medicamentos, si no tiene acceso al programa de devolución de medicamentos. ¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help>. Si la víctima se ha derrumbado, ha tenido una convulsión, tiene dificultad para respirar, o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911. Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

sed extrema
boca seca
mareos
confusión
cansancio extremo
vómitos
calambres estomacales

¿Qué otra información de importancia debería saber?

Asista a todas las citas con su médico y el laboratorio. Se debe revisar regularmente la presión arterial y realizarse exámenes de sangre ocasionalmente.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe al médico y al personal del laboratorio que está tomando furosemida.

No deje que nadie más use su medicamento. Haga a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta médica.

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=furosemida>

Last update: **2025/05/04 00:01**

