# Galea aponeurótica

(aponeurosis epicraneal ) cubre la parte superior de cráneo; por detrás se une entre el intervalo de su unión con los occipitales, específicamente en la protuberancia occipital externa y en las líneas más altas del hueso occipital de la nuca; por la frente, forma una corta y pequeña prolongación entre la unión con los frontales.




A ambos costados da lugar a los auriculares anterior y superior; en esta situación, pierde su caracter aponeurotico, y luego continua sobre la fascia temporal hasta el arco zigomático como una capa de tejido laminado areolar.

Está relacionado íntimamente al interludio de la firme, densa, capa de grasa y fibra que forma la fascia superficial del cuero cabelludo: se encuentra conectado al pericranium por tejido celular flácido, que permite a la aponeurosis, llevar en él la corteza para movilizarse en una distancia considerable.

En neurocirugía se puede usar para cubrir cualquier tamaño y localización de un defecto de la base de cráneo (Ito y col., 2011).

**Bibliografía**

Ito, E. et al., 2011. Skull base reconstruction using various types of galeal flaps. Acta Neurochirurgica. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21959965

From:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/ - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:
**https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=galea_aponeurotica**

Last update: **2025/05/04 00:02**