

## Giro precúneo o precuneus

Es una parte de la lóbulo parietal superior oculta en la fisura longitudinal medial entre los dos hemisferios cerebrales.

A veces se describe como el área medial de la corteza parietal superior.

El precuneus está limitado por delante por la rama marginal del surco cingulado, posteriormente por el surco parietooccipital, e inferiormente por el surco subparietal.

Está involucrado con la memoria episódica, procesamiento visuoespacial, reflexiones sobre uno mismo, y los aspectos de la conciencia.

Rara vez es objeto de lesiones aisladas debido a los accidentes cerebrovasculares o traumatismos tales como heridas de bala. Esto ha dado lugar a que sea “una de las zonas con menor precisión cartográfica de toda la superficie cortical”.

También se conoce como el lóbulo cuadrado de Foville.

La forma latina de praecuneus fue utilizado por primera vez en 1868 y los precuneus inglés en 1879.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**  
**ISSN 1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=giro\\_precuneo](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=giro_precuneo)

Last update: **2025/05/03 23:59**

