Guía de práctica clínica del aneurisma intracraneal

La Guía de Práctica Clínica para el manejo del aneurisma intracraneal proporciona recomendaciones basadas en la evidencia para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del aneurisma intracraneal.

Guía de práctica clínica del aneurisma intracraneal roto

Guía de práctica clínica del aneurisma intracraneal roto

Puntos clave

1. Diagnóstico

Imágenes diagnósticas: El diagnóstico de un aneurisma intracraneal suele realizarse mediante:

Angiografía cerebral por tomografía computarizada (angio-TC): Primera línea en la evaluación inicial de aneurismas, especialmente en casos de hemorragia subaracnoidea (HSA) aguda.

Angiografía por resonancia magnética (angio-RM): Útil en el diagnóstico de aneurismas no rotos y para seguimiento. Angiografía cerebral por cateterismo: Considerada el estándar de oro para la evaluación detallada del aneurisma y la vasculatura cerebral.

2. Clasificación

Los aneurismas se clasifican según:

Localización: Comúnmente en las bifurcaciones de las arterias del polígono de Willis.

Tamaño: Pequeños (<7 mm), medianos (7-12 mm), grandes (13-24 mm) y gigantes (>25 mm).

Estado: Aneurisma roto o no roto.

From:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/ - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=guia_de_practica_clinica_del_aneurisma_intracraneal

Last update: **2025/05/03 23:56**