

Hemangioblastoma cerebeloso

Clínica

El [hemangioblastoma](#) en el [cerebelo](#), suele cursar con una historia tórpidamente consistente en [cefalea](#) suboccipital intermitente (80%), vértigo, diplopia y alteraciones de conciencia secundarias a hidrocefalia (25%). La duración de los síntomas es larga (6-11 meses), presentándose el 50% de los pacientes con [síndrome](#) de [hipertensión intracraneal](#) (SHIC).

En la exploración física los hallazgos más frecuentes son papiledema, marcha atáxica, [síndrome cerebeloso](#) unilateral, [nistagmus](#) y afectación de [pares craneales](#) (V, VII, VIII) ¹⁾.

Diagnóstico

En la actualidad, la prueba preoperatoria ideal es la resonancia magnética (RM) cerebral sin y con contraste ya que define bien las características de la lesión, sus relaciones de vecindad y la posible presencia de nódulos en otras localizaciones.

¹⁾
Constans, IP., Meder, F., Maiuri, F., Donzelli, R., Spaziante, R., de Divitiis, E.: Posterior Fossa Hemangioblastomas. Surg Neurol. 1986; 25: 269-275.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=hemangioblastoma_cerebeloso

Last update: **2025/05/04 00:01**

