

# Hematoma subdural agudo tardío

Suponen el 0,5 % del [hematoma subdural agudo](#) tratado quirúrgicamente <sup>1)</sup>.

No está presente en el TAC o Resonancia inicial <sup>2)</sup>.

La indicación quirúrgica es la misma que para el hematoma subdural agudo.

<sup>1)</sup>

Cohen T I. Gudeman S K: Delayed traumatic intracranial hematoma In Neurotrauma. Narayan R K, Wilberger J E. and Povlishock J T.teds.). McGraw- Hill, New York. 1996: pp 689-701 . 206.

<sup>2)</sup>

Matsuda W, Sugimoto K, Sato N, Watanabe T, Fujimoto A, Matsumura A. Delayed onset of posttraumatic acute subdural hematoma after mild head injury with normal computed tomography: a case report and brief review. *J Trauma*. 2008 Aug;65(2):461-3. doi: 10.1097/01.ta.0000202465.13784.2a. PubMed PMID: 18288015.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=hematoma\\_subdural\\_agudo\\_tardio](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=hematoma_subdural_agudo_tardio)

Last update: **2025/05/03 23:57**

