

Hemorragia de ganglios basales

Clasificación

Localización

La localización más común en los [ganglios basales](#) es lateral basal (putamen y cápsula interna en 40-50%).

[Hemorragia putaminal](#)

[Hemorragia del núcleo caudado](#)

Etiología

Espontánea

Traumática

Clínica

Habitualmente causan [hemiparesia](#) contralateral, pérdida hemisensitiva y desviación ipsilateral conjugada de los ojos.

Los hematomas en la porción media del putamen cerca de la rodilla de la cápsula interna son responsables de hemiparesia persistente, mientras que las lesiones que se localizan más anterior y posteriormente pueden causar sólo signos motores deficitarios menores y transitorios.

En lesiones más posteriores, pueden presentarse sólo una hemianopsia, diafasia o cambios en la conducta.

Los hematomas en el núcleo caudado son responsables de alteraciones congoscitivas y en la conducta incluyendo abulia, agitación, inquietud y dismnesia; la hemiparesia (que a menudo es transitoria) puede aparecer cuando la hemorragia del caudado disecciona las regiones laterales hacia la cápsula interna.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=hemorragia_de_ganglios_basales

Last update: 2025/05/04 00:01

