

Spiotta, Alejandro M, y Salvador Martorell Matoses. 2011. «Neurosurgical Considerations After Bull Goring During Festivities in Spain and Latin America». *Neurosurgery* 69 (2) (Agosto): 455-461. doi:10.1227/NEU.0b013e3182191fb1.

El [Hospital Clínico Universitario de Valencia-España](#) y el Cerebrovascular Center, Neurological Institute, Cleveland Clinic en Ohio publican en Agosto 2011 en la revista *Neurosurgery*

Consideraciones neuroquirúrgicas tras herida por asta de toro en España y América Latina.

La víctima de un accidente por asta de toro puede tener una combinación de trauma penetrante y cerrado craneal y cervical en un 3,1% a 19% de los casos.

Estos pacientes se deben evaluar y tratar como politraumatizados con las pautas establecidas por la

[Brain Trauma Foundation](#)

Este algoritmo permite una evaluación rápida y triaje que es relativamente simple y fácil de seguir.


Se hace hincapié en la necesidad de determinar los sujetos con mayor riesgo de herniación inminente y la identificación de fuentes de sangrado para evitar la hipotensión.

El artículo se publica en la revista *Neurosurgery* y es free

[Artículo](#)

Field Management of Combat-Related Head Trauma

BTF
BRAIN TRAUMA
FOUNDATION



From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=herida_por_asta_de_toro

Last update: **2025/05/04 00:02**

