

# Hernia discal lumbar L5-S1

## Casos clínicos

### I7410

Varón de 51 años que ingresa con carácter programado para intervención por hernia discal lumbar L5-S1

Dolor en EID de 1 año de evolución con sensación de hipoestesia que se irradia por la cara posterior de la pierna hasta los dedos del pie.

Lasegue + a 40º EID. Sensibilidad conservada. Maniobras de flexoextensión del pie conservadas. ROT2+/4. No clonus.



Decúbito prono. Localización bajo escopia de espacio L5-S1. Incisión longitudinal. Disección de la musculatura paravertebral. Objetivar hemilamina de L5. Se procede a hemilaminectomía y localizando espacio discal sin objetivar clara protrusión discal. Se procede a microdiscectomía. En se segundo tiempo se inicia foraminotomía de raíz S1 hasta comprobar que esta se encuentra descomprimida. Se realiza mismo procedimiento a nivel de raíz L5 derecha. Hemostasia con bipolar y surgicel. Cierre por planos y piel con grapas.

El paciente ha evolucionado favorablemente con buen control de herida quirúrgica.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN  
1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=hernia\\_discal\\_lumbar\\_l5-s1](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=hernia_discal_lumbar_l5-s1)

Last update: **2025/05/04 00:02**

