


Hueso temporal

El hueso temporal, hueso del **cráneo** así llamado porque está situado en la región de este nombre, es un hueso par, irregular, neumático, situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo.



Contiene en su espesor el órgano vestibulococlear.

Su forma varía según las edades, en el feto y recién nacido se pueden distinguir tres porciones diferentes:

Porción Escamosa

Porción Timpánica

Porción Petrosa

En el adulto estas tres porciones se unen mediante una sinostosis para formar un hueso único. Estas tres piezas, al soldarse unas con otras, en su desarrollo, originan una serie de suturas más o menos visibles y permanentes. Debido a esta fusión sólo la concha conserva casi los mismos límites primitivos, las otras dos porciones cambian su disposición primordial, quedando de la siguiente manera:

Porción escamosa

Porción mastoidea(en el feto es la parte externa de la porción petrosa)

Porción petrosa (en el feto es la parte interna de la porción petrosa y la porción timpánica)

Porción escamosa o concha

La porción escamosa del temporal, plana, delgada, irregularmente circular, convexa por una de sus caras y cóncava por la otra, parece una valva de marisco, de donde deriva su nombre (de squama, escama). Esta se encuentra en la parte superior y lateral del temporal. va a estar soldada con las alas mayores del esfenoides y con el borde superior del parietal (formando en este la sutura temporo-parietal)

Porción petrosa

Porción mastoidea Hueso temporal. Cara inferior.

Situada en la parte posteroinferior del temporal, por detrás del conducto auditivo externo, formada por la parte mas externa del peñasco fetal. Se distinguen en ella una cara externa, otra interna y un borde circunferencial:

Cara externa: es plana mejor que convexa, muy irregular, termina inferiormente por una eminencia voluminosa de forma cónica, la apófisis mastoides.

Esta cara presenta frecuentemente una cisura dirigida hacia abajo y adelante, vestigio de la cisura petroescamosa posterior.

Por encima y atrás del orificio del conducto auditivo externo se observa un saliente pequeño, o espina de Henle y algo hacia atrás de ésta, una superficie con múltiples orificios vasculares, denominada zona cribosa.

Cerca del borde posterior de esta cara, se encuentra el orificio externo del conducto mastoideo, para la vena emisaria mastoidea que une el seno sigmoideo con venas del sistema yugular.

Apófisis mastoides:

Cara externa, más o menos convexa, presta inserción a la mayoría de los músculos rotatorios de la cabeza: el esternocleidomastoideo, el esplenio, el complejo menor.

Cara interna ofrece en su parte superior una ranura ancha y profunda dirigida de atrás adelante; es la ranura digástrica, en la que se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. La parte interna de este canal muestra una eminencia roma, alargada de adelante atrás, en cuya vertiente interna está labrado otro surco por donde pasa la arteria occipital. Dicho saliente recibe el nombre de eminencia yuxtamastoidea.

Cara interna: se confunde por delante con la base de roca. En este lugar se observa un amplio surco vertical o canal del seno sigmoideo, que lleva hacia la parte media el orificio interno del conducto mastoides.

Borde es libre en su parte superior y posterior, se confunde en el resto de su contorno, por una parte en la concha, y por otra con el peñasco, del que la porción mastoidea, no debemos olvidarlo, constituye una dependencia. Su porción libre es muy gruesa y rugosa sin ser dentada. está biselada por arriba a expensas de la tabla externa, y por atrás a expensas de la tabla interna. Su porción superior se articula con el parietal; su porción posterior con el occipital.

Eminencias

Apófisis Cigomática: Se articula con el apófisis temporal del cigomático.

Tubérculo articular: Es redondeada, se encuentra unido a la fosa mandibular.

Apófisis mastoidea: Es una proyección redondeada que se sitúa detrás del conducto auditivo externo y constituye un punto de inserción de los músculos.

Apófisis estiloides: Localizada en la cara posteroinferior de la porción petrosa es una apófisis muy larga en forma de espina y dirigida hacia abajo, adelante y adentro. Es el punto de inserción proximal del Ramillete de Riolo.

Depresiones

Conducto carotídeo: Pasa la arteria carótida interna, plexo venoso carotídeo, plexo simpático carotídeo interno.

Foramen yugular: Agujero por el que pasa la vena yugular, Nervio Glosofaríngeo IX, Nervio Vago X, Nervio Accesorio Espinoso XI.

Fosa mandibular: Se encuentra delimitada por el cóndilo temporal o tubérculo articular, por la fisura de Glaser o timpanoescamosa, por los tubérculos cigomáticos anterior y posterior.

Conducto auditivo externo: Se comunica con el oído medio.

Conducto auditivo interno: Se introducen en él, el nervio facial VII, el nervio vestibulococlear VIII, y la arteria laberíntica.

Agujero mastoideo: lo atraviesa una vena emisaria.

Agujero Estilomastoideo, Nervio facial (VII par craneal), Vasos Estilomastoideos.

Hiatus de Falopio- Nervio petroso superficial mayor

Hiatus Accesorios- Nervios Petroso Superficial Menor, profundo mayor y menor.

Techo del tímpano- en la zona anterosuperior de la porción petrosa.

Eminencia Arcuata- en la zona anterosuperior de la porción petrosa, se corresponde interiormente con el canal semicircular superior.

Acueducto Vestibular- Conducto endolinfático

Fosa Arcuata- en la zona posterosuperior de la porción petrosa.

Fosa de Glaser- localizada en la cara anterosuperior de la porción petrosa, que aloja el ganglio del mismo nombre.

Conducto Timpánico (Jacobson)- localizado en la cara inferior de la porción petrosa en una cresta que separa el conducto carotídeo del foramen yugular; por este conducto pasa el nervio timpánico (Jacobson).

Articulaciones

El hueso temporal se articula con cinco huesos:

Arriba con el parietal

Atrás con el hueso occipital

Por delante y por dentro con el esfenoides

Por delante y por fuera con el maxilar

Por abajo con la mandíbula (Articulación temporomandibular)

Inserciones musculares

Trece músculos, sin comprender los del oído medio, toman inserción en el temporal:

Porción escamosa:

Músculo crotafitos o temporal

Porción petrosa:

Músculo periestafilino interno y casi siempre el petrofaringeo de

ALBINUS

Porción mastoidea:

Músculo auricular posterior

Músculo esternocleidomastoideo

Músculo esplenio de la cabeza

Músculo complejo menor

Músculo digástrico

Apófisis cigomática

Músculo masetero

En algunos sujetos un manojó del músculo auricular anterior

Apófisis estiloides

Músculo estilogloso

Músculo estilohioideo

Músculo estilofaríngeo

Función

Proteger el encéfalo y los órganos de la audición.

Proporciona parte de las superficies articulares para la Articulación temporomandibular (cavidad glenoidea y raíz transversa de la apófisis cigomática)

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=hueso_temporal

Last update: **2025/05/03 23:57**

