Malformación vascular espinal

Grupo heterogéneo de lesiones que puede alterar la función de la médula espinal, por lo que son consideradas como una causa tratable de mielopatía.

Epidemiología

4 % de las masas intraespinales.

El 80 % se presentan entre los 20 a los 60 años.

Las lesiones vasculares espinales más comunes en adultos y ancianos son las fístulas arteriovenosas espinales durales, que predominan en el sexo masculino y representan el 56% de las malformaciones vasculares espinales.

Clasificación

La fístula arteriovenosa dural espinal es con el 80 % la malformación vascular espinal mas frecuente.

Cavernoma intramedular

malformación arteriovenosa espinal.

Clasificación de la American/English/French Connection

Intradurales, extradurales, y complejas, teniendo cada una de ellas una suplencia arterial diferente.

Según la anatomía patológica se las clasifica en angiomas cavernosos, hemangiomas capilares y lesiones arteriovenosas (AV).

Clínica

Déficit neurológico progresivo en el 85 %.

Del 10 al 20 % se presentan con mielopatía de inicio brusco secundario a una hemorragia.

Las manifestaciones clínicas de las MAV espinales se expresan como déficits neurológicos agudos, causados principalmente por sangrado, o subagudos, que se caracterizan por una mielopatía en forma de paraparesia de instauración aguda o progresiva, asociada a trastornos sensoriales y disfunción urinaria, intestinal, y sexual, dependiendo del sitio de afección, que puede ser desde los segmentos cervicales hasta los lumbares.

From:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/ - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=malformacion_vascular_espinal

Last update: **2025/05/04 00:03**