

El melanoma coroidal, constituye alrededor de un 85 % de todos los melanomas intraoculares.

Muchas veces son asintomáticos o se presentan con síntomas vagos como visión borrosa, defectos en los campos visuales y raramente dolor.

Debido a la falta de elementos patognomónicos del melanoma coroidal, al encontrarse con una masa intraocular el oftalmólogo debe considerar otras lesiones posibles en esta localización.

La metástasis cerebral es muy rara, pero exige un seguimiento de por vida (de A Silva y col., 2011).

## Bibliografía

de A Silva, Danilo O, Georgios K Matis, Leonardo F Costa, Matheus A P Kitamura, Eduardo V de C Júnior, Breno J A P Barbosa, Isaac B Santiago, et al. 2011. «Ocular melanoma: Keep your eyes open for late brain metastases». Surgical Neurology International 2: 144. doi:10.4103/2152-7806.85985.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=melanoma\\_coroidal](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=melanoma_coroidal)

Last update: **2025/05/04 00:02**

