

El **melanoma leptomeningeo** difuso invade la **piamadre** y se extiende por el **espacio subaracnoideo** preferentemente en la base del cerebro, pudiendo producir hidrocefalia.

Puede acompañarse de masas nodulares en diferentes puntos, invadir el parénquima y diseminarse a través del **líquido cefalorraquídeo**.

A nivel espinal puede haber compromiso pial, intramedular y extensión a través de la raíz nerviosa.

El diagnóstico puede ser difícil debido a la clínica inespecífica

La tomografía computarizada con hiperintensidad cisternal puede ser similar a la imagen de hemorragia subaracnoidea (Ng y col., 2013).

El tratamiento es paliativo.

El pronóstico es malo, incluso en ausencia de malignidad histológica.

La mayoría de los pacientes se deterioran rápidamente tras la aparición de trastornos neurológicos y mueren al poco tiempo de la enfermedad.

<http://escuela.med.puc.cl/publ/cuadernos/2003/melanomas.html>

Bibliografía

Ng, R Yt, D Yw Siu, G Kc Wong, H K Ng, and W S Poon. 2013. "An Uncommon Mimic of Spontaneous Subarachnoid Haemorrhage." Hong Kong Medical Journal = Xianggang Yi Xue Za Zhi / Hong Kong Academy of Medicine 19 (1) (February): 80-81.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=melanoma_leptomeningeo_difuso

Last update: 2025/05/03 23:56

