

Sin los meningiomas de grado WHO 2 y 3

Meningioma (WHO 2)

Células claras

Cordoide

Atípico

Meningioma (WHO 3)

Papilar

Rabdoide

Anaplásico

El papel de la radiación sigue siendo poco clara.

Se precisan ensayos clínicos prospectivos para evaluar la utilidad de la radioterapia externa adyuvante en los meningiomas grados II y III con el fin de definir con mayor precisión el subgrupo de pacientes que pueden beneficiarse de la radioterapia adyuvante (Stessin y col., 2012).

Bibliografía

Stessin, Alexander M., Allie Schwartz, Grigorij Judanin, Susan C. Pannullo, John A. Boockvar, Theodore H. Schwartz, Philip E. Stieg, and A. Gabriella Wernicke. 2012. "Does Adjuvant External-beam Radiotherapy Improve Outcomes for Nonbenign Meningiomas? A Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-based Analysis." *Journal of Neurosurgery* 117 (4) (October): 669-675.
doi:10.3171/2012.7.JNS111439.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=meningioma_agresivo

Last update: **2025/05/04 00:02**

