

Meningioma angiomatoso

Es una rara variante histológica del [meningioma](#).

En una serie de 27 casos la edad de los pacientes osciló entre 24 a 72 años con una media de 51,8 años.

La presentación clínica no es específica y depende de la localización del tumor y se debió principalmente al efecto de masa.

En la tomografía computarizada (TC), mostró ligera hiperdensidad.

En las imágenes de resonancia magnética (MRI), hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2.

En la histología, todos los tumores mostraron abundantes vasos sanguíneos con menos diferenciación focal meningotelial clásica.

Presentan edema peritumoral más frecuentemente y son ricos en vasos sanguíneos.

En general, el pronóstico es tan bueno como otros meningiomas benignos [(Liu, Zhiguo, Chuanwei Wang, Hongwei Wang, Yunyan Wang, Jian Yi Li, and Yuguang Liu. 2013. "Clinical Characteristics and Treatment of Angiomatous Meningiomas: a Report of 27 Cases." International Journal of Clinical and Experimental Pathology 6 (4): 695–702.)].

Bibliografía

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=meningioma_angiomatoso

Last update: 2025/05/03 23:59

