

Meningioma frontobasal

Meningioma del surco olfatorio.

Meningioma del plano esfenoidal

Son benignos, extraparenquimatosos y tienen un crecimiento lento, por lo que los síntomas y signos suelen ser debidos a compresión de estructuras adyacentes.

Se caracterizan por tres tipos de síntomas generales : Epilepsia ,déficit neurológico focal y trastornos neuropsicológicos.

Causan con frecuencia epilepsia focal

En meningiomas muy anteriores suelen tener un síndrome frontal (alteraciones del comportamiento).

Los localizados en el surco olfatorio dan lugar al síndrome de Foster-Kennedy (atrofia de papila con pérdida de visión en el ojo del lado más afecto y edema de papila en el otro ojo). Además presentan un cuadro frontal florido con alteraciones psíquicas, demencia, alteraciones de esfínteres...

En región central van a producir paresias o hipoestesias en extremidades.

En los meningiomas frontobasales la irrigación proceder de ramas de la arteria etmoidal que es a su vez rama de la arteria oftálmica.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=meningioma_frontobasal

Last update: **2025/05/04 00:02**

