

Metástasis cerebral por cáncer de pulmón

La [metástasis cerebral](#) del [cáncer de pulmón](#) primario, son la fuente más común de metástasis cerebrales, representando el 40%.

Del 10 a 80% de los pacientes con cáncer de pulmón primarios se presentan metástasis cerebrales sincrónicas o metacrónicas (diagnosticadas 6 meses después del primario).

El tratamiento dependerá de las circunstancias de diagnóstico (sintomática o no), la historia del cáncer (metástasis cerebrales sincrónicas o metacrónicas), histología y el número de lesiones (Barlesi y col., 2013).

Tipos

[Metástasis cerebral por cáncer de pulmón de células pequeñas \(microcítico\)](#)

[Metástasis cerebral por cáncer de pulmón de células no pequeñas \(no microcítico\)](#)

Bibliografía

Barlesi, Fabrice, Natalia Khobta, Agnès Tallet, Anthony Goncalves, David Azria, Jean-Philippe Spano, Antoine F Carpentier, Jean Régis, and Philippe Metellus. 2013. "Management of Brain Metastases for Lung Cancer Patients." *Bulletin Du Cancer* (March 21). doi:10.1684/bdc.2013.1721.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=metastasis_cerebral_por_cancer_de_pulmon

Last update: 2025/05/03 23:59

