

Es un **abordaje cervical anterior** mínimamente invasivo que puede emplearse para la descompresión de lesiones de localización anterior a la médula espinal (Jho y Ha, 1999).

Es un procedimiento seguro y eficaz para el tratamiento de la radiculopatía cervical unilateral, si se preserva la altura discal. Para ello es necesario preservar el disco y realizar la foraminotomía tan pequeña como sea posible eliminando la causa de la compresión (Kim y col., 2012).

Tipos

Transuncal

Transcorporal

George y col., revisaron la técnica original de Verbiest para el abordaje oblicuo transcorporal en las lesiones situadas en la parte anterior del canal espinal cervical, pero era necesario exponer la arteria vertebral con sus riesgos inherentes (George y col., 1993).

Bibliografía

George B, Zerah M, Lot G, et al. Oblique transcorporeal approach to anteriorly located lesions in the cervical spinal canal. Acta Neurochir. 1993;121:187-190. doi: 10.1007/BF01809273

Jho, H D, and H G Ha. 1999. "Anterolateral Approach for Cervical Spinal Cord Tumors via an Anterior Microforaminotomy: Technical Note." Minimally Invasive Neurosurgery: MIN 42 (1) (March): 1-5. doi:10.1055/s-2008-1053359.

Kim, Myung-Hyun, Professor. 2012. "Clinical and Radiological Long-Term Outcome of Anterior Microforaminotomy for Cervical Degenerative Disease." Spine (November 19). doi:10.1097/BRS.0b013e31827ddd9e.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=microforaminotomia_anterior

Last update: 2025/05/03 23:58

