

La migraña oftalmopléjica es una patología rara, caracterizada por dolor de cabeza y asociada a paresis o parálisis de los nervios oculomotores (oculomotor, troclear y abducente).

El diagnóstico puede ser después de haber demostrado todas las investigaciones de lesiones intracraneales.

La etiología varía desde la compresión vascular del vasa nervorum hasta la dilatación e hiperpulsación de las arterias de la base del cráneo.

Se ha descrito un hamartoma en la REZ del nervio motor ocular común (Akimoto y col., 2011).

## Bibliografía

Akimoto, Jiro, Shinjiro Fukami, Ryo Hashimoto, and Jo Haraoka. 2011. "Neuromuscular hamartoma is a possible primary pathology of oculomotor ophthalmoplegic migraine." *Cephalalgia: An International Journal of Headache* (December 15). doi:10.1177/0333102411431331. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22174363>.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=migraña\\_oftalmopléjica](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=migraña_oftalmopléjica)

Last update: **2025/05/03 23:56**

