

El músculo recto inferior del ojo se encuentra en la región inferior de la [órbita](#) ocular y es uno de seis músculos que controlan el movimiento del globo ocular. La contracción del recto inferior produce varios movimientos del ojo, le gira hacia abajo y asiste en el movimiento hacia el medio y el que le aleja de la línea media.

Nace con el resto de los músculos rectos del ojo, en el vértice de la órbita ocular por medio de un tendón común, el [anillo de Zinn](#). Después de separarse del resto de los músculos rectos, el recto inferior sigue de atrás adelante por debajo del [nervio óptico](#), del que está separado por el tejido adiposo de la órbita.

Las fibras inferiores del músculo tiene relación con el suelo de la órbita y fibras del músculo oblicuo menor. Al final de su recorrido, el músculo recto inferior termina en un tendón aplanado que se inserta en la esclerótica, algo por debajo de la circunferencia de la córnea.

La inervación del recto inferior viene dado por el [nervio oculomotor](#).

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=musculo_recto_inferior

Last update: **2025/05/04 00:02**

