


Nervio ciático

Es el nervio más ancho y largo del cuerpo.



Comienza en la [pelvis](#), va hasta la parte superior de los muslos por los cuales continúa y se divide en dos pequeñas ramas

Su largo curso y gran tamaño hacen al nervio ciático particularmente vulnerable a que la presión o daño provoque dolor.

El dolor se origina en la parte superior a lo largo de la médula espinal cuando las raíces nerviosas se comprimen o dañan a causa del estrechamiento de la columna vertebral o por el desplazamiento de un disco intervertebral. A su afectación por compresión u otra causa se le llama comúnmente [ciática](#).

Parálisis del nervio ciático

Se produce como consecuencia de una mala praxis en las inyecciones intramusculares en glúteos o muslos, por afectación directa del nervio con la punción, pero también se puede dar debido a procedimientos quirúrgicos como la reducción de luxación de cadera o en los casos de osificación heterotópica.

Ramas

[Nervio peroneo común](#)

[Nervio tibial](#)

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=nervio_ciatico

Last update: **2025/05/03 23:57**

