


Nervio vidiano

Consta de tres ramas:

1. ramo carotideo, procedente del plexo simpático, que rodea la carótida interna
2. el nervio petroso superficial mayor (que nace del ganglio geniculado del facial y atraviesa el hiato de Falopio)
3. el nervio petroso profundo mayor (procedente del ramo de Jacobson, ramo del glossofaríngeo).

Estas tres ramas, (simpática, motriz y sensitiva), el cual sale del cráneo por el agujero rasgado anterior, se introduce en el conducto vidiano y llega así hasta el ganglio de Meckel.



CHO: [coana](#)

DPA: [arteria palatina descendente](#)

DPN: [nervio palatino descendente](#)

EER: [receso esfenotmoidal](#)

FR: [agujero redondo](#)

IN: [nervio infraorbitario](#)

MA: [arteria maxilar](#)

ON: [nervio óptico](#)

SPA: [arteria esfenopalatina](#)

ST: [cornete superior](#)

VN: [nervio vidiano](#)

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=nervio_vidiano

Last update: **2025/05/04 00:04**

