

El término neuritis óptica retrobulbar describe una inflamación del nervio óptico que clínicamente se caracteriza por pérdida de visión.

Entre la gran variedad de afecciones que pueden producirla, la más frecuente sigue siendo la esclerosis múltiple, pero también un aneurisma cerebral (Miller y col., 1995; Chang y col., 2011).

La relación entre la afección de los senos paranasales y las neuritis ópticas es controvertida; la literatura recoge casos anecdóticos que la avalan. Se han descrito variados mecanismos por los que una enfermedad para-nasal puede llegar a producir tal afección.

El tipo de tratamiento que se realice dependerá de la causa subyacente, y en determinadas ocasiones se puede requerir de tratamiento quirúrgico.

Bibliografía

Chang JH, Lee DK, Kim BT, Ohn YH. Computed tomographic angiogram of an anterior communicating artery aneurysm causing acute retrobulbar optic neuropathy: a case report. Korean J Ophthalmol. 2011 Oct;25(5):366-8. Epub 2011 Sep 20. PubMed PMID: 21976949; PubMed Central PMCID: PMC3178776.

Miller NR, Savino PJ, Schneider T. Rapid growth of an intracranial aneurysm causing apparent retrobulbar optic neuritis. J Neuroophthalmol. 1995 Dec;15(4):212-8. PubMed PMID: 8748557.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=neuritis_optica_retrobulbar

Last update: 2025/05/03 23:57

