

Park Bench

Sinónimo: Posición lateral oblicua

El paciente se coloca en decúbito semiprono con la cabeza rotada y semiflexionada con la frente mirando al suelo.

Esta posición permite un mejor acceso a las estructuras de la línea media que el decúbito lateral recto.



Su uso ha ido aumentando en detrimento de la posición sentada debido al potencial de complicaciones graves como una embolia gaseosa venosa.

Proporciona una posición cómoda para el cirujano. Sin embargo, el posicionamiento es complejo y conlleva un riesgo de estiramiento del plexo braquial. La orientación espacial es más difícil (Porter y col., 1999).

La posición lateral no modifica la función hemodinámica y respiratoria en pacientes sanos ¹⁾.

Complicaciones

Hay que proteger los nervios periféricos igual que en posición lateral

Hay peligro de congestión venosa y **macroglosia** como en decúbito supino con la cabeza rotada ²⁾.

Bibliografía

Porter, J M, C Pidgeon, and A J Cunningham. 1999. "The Sitting Position in Neurosurgery: a Critical Appraisal." *British Journal of Anaesthesia* 82 (1) (January): 117-128.

Toyama, S, K Hoya, K Matsuoka, T Numai, and M Shimoyama. 2012. "Massive Macroglossia Developing Fast and Immediately After Endotracheal Extubation." *Acta Anaesthesiologica Scandinavica* 56 (2) (February): 256-259. doi:10.1111/j.1399-6576.2011.02575.x.

¹⁾
Kehrli, P, L Pain, and D Maitrot. 1998. "[Intracranial Surgery in the Lateral Position]." *Annales Françaises D'anesthésie Et De Réanimation* 17 (2): 177-179.

2)

Koizumi, Hiroyuki, Satoshi Utsuki, Madoka Inukai, Hidehiro Oka, Shigeyuki Osawa, and Kiyotaka Fujii. 2012. "An Operation in the Park Bench Position Complicated by Massive Tongue Swelling." Case Reports in Neurological Medicine 2012: 165860. doi:10.1155/2012/165860.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=park_bench

Last update: **2025/05/03 23:59**