

Quiasma prefijado

Localización del [quiisma óptico](#) por encima del [tubérculo selar](#), que se presenta en el 15% de los pacientes.

Un quiasma prefijado y un tubérculo selar prominente impiden el acceso por vía anterior a patologías como [craneofaringioma](#) y tumores de la hipófisis.

Peropuede ser debido al desplazamiento anterior que causa el propio craneofaringioma.

Si el quiasma está prefijado o el tumor se extiende posteriormente habrá compresión de un solo tracto óptico, que causará [hemianopsia homónima](#)¹⁾.

Bibliografía

¹⁾

Gulsen, Salih, Ahmet Hakan Dinc, Melih Unal, Nergis Cantürk, y Nur Altinors. 2010. Characterization of the anatomic location of the pituitary stalk and its relationship to the dorsum sellae, tuberculum sellae and chiasmatic cistern. Journal of Korean Neurosurgical Society 47, no. 3 (Marzo): 169-173. doi:10.3340/jkns.2010.47.3.169.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**



Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=quiasma_prefijado

Last update: **2025/05/03 23:56**