

Radiculopatía

La radiculopatía se presenta al comprimirse una [raíz medular](#) frecuentemente a nivel del [agujero de conjunción](#) intervertebral.

Tipos

Según el nivel y la raíz se dividen en cervical, dorsal y lumbar

La sintomatología depende de la raíz que este siendo comprimida y las estructuras a las cuales dicha raíz inerve.

Sin embargo existen características de los dolores por radiculopatía que se deben resaltar como lo son:

- Dolor unilateral
- Disestesias tipo laceración o corriente
- Se exacerba con las maniobras de valsalva
- Causado por lesiones extramedulares

Causas vasculares

Hematoma epidural espinal

Hematoma subdural espinal

Malformación arteriovenosa espinal

Hemangioma vertebral

Hemangioma cavernoso espinal epidural

Anomalías arteria vertebral (tanto tortuosidad y disección)

Aneurisma aórtico

Quistes sinoviales hemorrágicos

Hematoma de ligamentum flavum

Varices venosas (Benny y col., 2011).

Bibliografía

Benny, Benoy V, Ameet S Nagpal, Paul Singh, and Matthew Smuck. 2011. "Vascular Causes of Radiculopathy: a Literature Review." *The Spine Journal: Official Journal of the North American Spine Society* 11 (1) (January): 73-85. doi:10.1016/j.spinee.2010.09.027.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=radiculopatía>

Last update: **2025/05/04 00:01**

