

# Recomendaciones tras un test de infusión

**Reposo** en **cama** durante el día de hoy, con **vigilancia** clínica.

Mañana podrá **levantarse** y movilizarse dentro del domicilio, evitando **esfuerzos**.

Pasado mañana podrá retomar sus **actividades** habituales y abandonar el domicilio si lo desea, siempre que no aparezcan síntomas nuevos (cefalea intensa, náuseas, vómitos, fiebre, alteración del nivel de conciencia o focalidad neurológica). En caso de aparición de alguno de estos síntomas, se recomienda acudir lo antes posible al servicio de urgencias o contactar con los servicios sanitarios.

Se solicitará fecha de revisión en consultas externas de Neurocirugía con el Dr. (), para valoración evolutiva y toma de decisiones en función del resultado del test de infusión y la evolución clínica del paciente.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=recomendaciones\\_tras\\_un\\_test\\_de\\_infusion](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=recomendaciones_tras_un_test_de_infusion)

Last update: **2025/05/04 00:01**

